

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 30-7-71 197644

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE LA RÉGION PARISIENNE

PARIS, HAUTS DE SEINE, SEINE ST DENIS, VAL DE MARNE, ESSONNE, VAL D'OISE, YVELINES, SEINE ET MARNE

RÉGISSEUR RECETTES-AVANCE - D.D.A. PROTECTION DES VÉGÉTAUX, 47 Av. Paul-Doumer, (93) MONTREUIL-S-BOIS - 287 76-71

C. C. P. PARIS 9063-96

ABONNEMENT ANNUEL

25 F

29 JUILLET 1971

BULLETIN N° 130

Supplément n° 1

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES.

CULTURES FRUITIÈRES

Des éclosions d'oeufs issus des papillons de fin du 1er vol sont en cours, faibles en général, très faibles en vergers de zones froides (exemple : Plateau Gometz Limours). Traiter en fin de mois, d'autant plus que l'efficacité du dernier traitement a été réduite par les pluies.

Le second vol a débuté et des pontes ont pu être déposées, surtout en zones urbaines.

D I V E R S.

- TAVELURE : se méfier des contaminations tardives favorisées par le type de temps actuel.

- CARPOCAPSE DES PRUNES : vol en cours. Protection nécessaire.

- ACARIENS : présence d'oeufs, larves, nymphes.

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE.

GRANDES CULTURES

Sauf en situations humides où la végétation s'est maintenue, ainsi que la maladie, le Mildiou a été détruit par la sécheresse.

Bien que de nouvelles contaminations se produisent, une période de 10-12 jours sera nécessaire pour que la maladie prenne un caractère "explosif".

Etant donné l'état végétatif à la fin de la période sèche, les pluies risquent de déclencher des repousses sur fanes et sur tubercules. Le rendement, souvent, n'est pas très élevé.

Compte tenu de ces observations :

1°/ - Situations à végétation nécessaire pour une augmentation de rendement : un traitement doit être réalisé dès que possible.

2°/ - Dans les autres cas, le défanage est à appliquer dès que l'infestation Mildiou se généralisera. Bien que les contaminations aient été très diverses, il semble que la date du 10 août ne puisse être dépassée (sauf retour à un temps sec) pour cette intervention.

Dans toutes les cultures il convient de suivre l'évolution de la maladie.

CULTURES LEGUMIÈRES

- THRIPS DU POIREAU : fortes attaques locales.

- TEIGNE DU POIREAU : vol assez important en cours.

- MOUCHE DU CHOU : recrudescence du vol et de l'activité.

- MILDIOU DE LA TOMATE : taches constatées en culture.

V I G N E

- VERS DE LA GRAPPE - MILDIOU : assurer la protection des grappes.

L'Ingénieur et le Technicien
chargés des Avertissements Agricoles,
H. SIMON et R. MERLING.

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux,
R. SARRAZIN.

Imprimerie de la Station de la Région Parisienne - Directeur-Gérant : L. BOUYX. P 281
47, Av. Paul Doumer, 93- MONTREUIL-SOUS-BOIS.